大阪府産蜘蛛目錄

八木沼健夫

大阪市住吉區中野町三三八番地

Yaginuma T.— A provisional list of spiders from Osaka Prefecture, Japan.

緒言

大阪府産蜘蛛の研究に着手してより，こゝに滿六ヶ年の星霜を經來つたが，途中昭和9年9月21日の風水害に遭ひ，それまで採集した100種餘の標本は盡く高潮の奮ふ所となり，其の後1934年再び改めて調査を始めて現在に到つた。もとより日淺き爲　未だその全貌を明にすることは出來ないが，大阪府の蜘蛛に關する文獻乏しく，小生の知る所，大阪博物學會創刊號（昭. 5. 10. 30）に安藤氏の記事あるのみで，目錄の形をとつたものを見ず，よつて，現在までに判明した150種を目錄として編纂することも敢へて徒爾ならずと考へこゝに掲ぐる次第である。大阪府産蜘蛛目錄としては物足りない感じがあるが，一先づ豫報的の圖表となし，今後大いに調査研究し，增補してやがては完璧を期する考へである。始に當り，標本査定並に種々御指導を賜つた植村利夫氏に，貴重なる文獻を御提供下さつた齋藤三郎氏に，採集，調査に御盡力下さつた田中正行氏に，又，地形解說記載に御援助を願つた匝橋喜久三氏に，その他研究上種々御助言を賜り御指導を仰いだ千原，長友，牧，安藤，土屋，三田村，諸先生に深甚の感謝の意を表する。

大阪府蜘蛛概觀

大阪府は地形的又氣候的の變化少く，從つて特殊なる種を見ず。殆どが普通種であつて，隣縣の和歌山の如く熱帶性の分子にも乏しく，未完成で斷言は出來ないが，北方・南方の兩系統のものが相混じてゐる樣に思はれる。地方產のもの，或は植村氏の和歌山のものと比較下さるなら何等かの暗示を得られることと思ふ。特記する程の種は持たないが，比較的重要なのはキノボリトタテグモ（*Pachylomerus fragaria*），ナカムラオニグモ，ヒトヘグモ等を產することである。地形の關係上平原性の種が多い。

大阪府地形の管見

目錄記載上，分布を明にするために，簡單なる地形解說を附す。

【北部山地】

寶塚から池田，茨木，山崎線は，老坂山脈の支脈天王，行者，阿武，箕面大峰の山々の山麓線で，所謂箕面斷層の前線は，高燥な千里山台地（三島台地）や雲雀ヶ丘となつてゐる。川も又武庫川，猪名川，茨木川，芥川等があつて其の出口に寶塚，池田等の山麓町が並んでゐる。これより以北は所謂丹波高原の一部で，隆起準平原台地を有し，大阪府の特異性よりも中國地方の性質を有してゐる。

【東部山地】

男山は第三紀であるが，生駒山，信貴山は花崗斑岩よりなり，大和川の峽隘迄を生駒山脈とし，それより南も同樣の花崗斑岩よりなる葛城山，金剛山の高峰をなすものを金剛山脈といふ。この兩山脈は地壘をなし，急斜面である三角切面を大阪府側に，奈良縣側には緩傾斜を以てやゝ傾動地塊の形を取つてゐる。大阪平野に面する山麓階には，第三紀層又は洪積層の枚方台地（交野原）と埴生臺地（泉北丘陵）とがある。



（大阪府地形區地圖）

【南部山地】

紀川，櫛田川を結ぶ所謂中央裂線以北に和泉山脈がある。この山脈は北面に階段狀に斷層を持つ地壘であつて，大阪平野に先に述べた埴生臺地（泉北丘陵）の山麓階が附加されて大和川の人工的サブセクエント流路の附近に及び尙一部は大阪市の中に入り，所謂石山丘陵として第三紀層の臺地として大阪の山の手をなしてゐる。

【大阪平野】

淀川は山崎の峽隘より，大和川は龜ノ瀨の峽隘より，又其の他の河川の協力によつて作られた一大沖積平野で大阪は淀川三角洲に立地してゐる。尙大阪市の西部築港附近は最近の埋立地である。

大和川は東部山地の山麓町である。柏原を軸として淀川となつて流路を持

つてゐたものが，德川綱吉寶永年間に埴生臺地の末端を人工的に堺市方面にコースを變へたのである。

以上の如く大阪府下は北に，東に，南に，山をめぐらし，西には海をひかへ，その中央部は平野をなしてゐるが，これは瀨戸內海陷沒地帶の一部に屬してゐるが，淀川，大和川の堆積と土地の隆起作用とにかくも大平野を生ぜしめたのである。

地形區は大別すると，以上四地形區になるが細割すると次の如くである。

Ⅰ. 北部山地 { 1. 丹波山地（老坂山脈） / 2. 千里山丘陵
Ⅱ. 東部山地 { 1. 生駒，金剛山脈 / 2. 枚方臺地（交野臺地） / 3. 石山丘陵
Ⅲ. 南部山地 { 1. 和泉山脈 / 2. 埴生臺地（泉北丘陵）
Ⅲ. 大阪平野

種の分布は主として，四大別の地形區により記入する。

目　　錄

分類は岸田氏の蜘蛛目新分類體系（1930）に從つた。目錄記載以外に種名未確定のもの數種あり，後日判明次第追加する豫定である。尙未確定種であつても重要なるものは sp. として目錄に入れて置いた。以下大阪府產26科88屬156種の蜘蛛目錄を揭げる事にする。

I. Subordo PROTOTHELAE 原疣亞目

〔≒MYGALOMORPHAE〕

A. Suprafam. CTENIZOIDEA トタテグモ上科

1. Fam. CTENIZIDAE トタテグモ科

1. *Pachylomerus fragaria* Doenitz　　キノボリトタテグモ

南部山地（南松尾村以外分布不詳）。

B. Suprafam. DIPLUROIDEA ジヤウゴグモ上科

2. Fam. ATYPIDAE ヂグモ科

2. *Atypus Karschi* Doenitz　　ヂ　グ　モ

3. *Calomata signata* Karsch　　ワスレナグモ

南部山地（南松尾村にて一頭採集せるのみ）。

II. Subordo METATHELAE 新狭亞目

〔≒OPISTHOTHELAE, ARACHNOMORPHAE〕

C. Suprafam. DYSDEROIDEA キノシシグモ上科

3. Fam. DYSDERIDAE キノシシグモ科

4. *Ariadna lateralis* (Karsch)　　ミヤグモ

北部，東部，南部山地，平野には見ず。

D. Suprafam. ULOBOROIDEA ウヅグモ上科

4. Fam. DICTYNIDAE ハグモ科

5. *Dictyna foliicola* Boesenberg et Strand　　ヒナハグモ

6. *Dictyna felis* Boesenberg et Strand　　ネコハグモ

5，6 共に大阪平野に普通，5 の方多し。

7. *Lathys annulata* Boesenberg et Strand　　クロシロカレハグモ

北部山地（妙見山）。

5. Fam. ULOBORIDAE ウヅグモ科

8. *Uloborus tokyoensis* Kishida　　トウキヤウウヅグモ

9. *Uloborus sybotides* Boesenberg et Strand　　カタハリヒカゲグモ

10. *Uloborus varians* Boesenberg et Strand　　オホウヅグモ

11. *Hyptiotes montanus* Kishida　　アフギグモ

南部山地（牛瀧山）。

12. *Miagrammopes orientalis* Boesenberg et Strand　　マネキグモ

南部山地（牛瀧山　岩湧山）。

E. Suprafam. ARGIOPOIDEA コガネグモ上科

6. Fam. SCYTODIDAE ヤマシログモ科

13. *Loxosceles rufescens* (Dufour)　　イトグモ

大阪平野（大阪市内住宅）。

14. *Scytodes nigrolineata* Simon　ヤマシログモ

15. *Scytodes thoracica* Latreille　ユカタヤマシログモ

7. Fam. THERIDIIDAE ヒメグモ科

16. *Argyrodes bonadea* (Karsch)　シロガネヰサフラフグモ

17. *Argyrodes fissifrons* O. P. Cambridge　チリヰサフラフグモ

周園山地に多く，平野には少し。

18. *Argyrodes fur* Boesenberg et Strand　フタヲヰサフラフグモ

19. *Argyrodes miniaceus* (Doleschall)　アカイロヰサフラフグモ

20. *Ariamnes cylindrogaster* Simon　ヲナガグモ

周園山地に多く，平野には殆ど見ず。

21. *Bellinda nipponica* Kishida　ベリシダヰサフラフグモ

22. *Enoplognatha foliicola* Doenitz et Strand　コノハヒメグモ

北部山地（箕面方面）。

23. *Teutana transversifoveata* Boesenberg et Strand　カレハヒメグモ

大阪平野各地。

24. *Lithyphantes dubius* Doenitz et Strand　ヌサグモ

南部山地。

25. *Theridion japonicum* Boesenberg et Strand　ヒメグモ

周園山地，平野には見ず。

26. *Theridion tepidariorum* C. L. Koch　オホヒメグモ

27. *Dipoena* sp.　ミデングモ一種

亜成體なる爲，種名決定出來ず。

28. *Narihira delicata* Kishida　ナリヒラグモ

周園山地。

8. Fam. LINYPHIIDAE サラグモ科

29. *Linyphia limbatinella* Boesenberg et Strand　チビサラグモ

大阪平野。

30. *Linyphia marginata* C. L. Koch　サラグモ

31. *Linyphia nipponica* Kishida　ヒラサラグモ

32. *Linyphia montana* (Clerck)　ヤマデサラグモ

33. *Oedothorax exsiccatus* Boesenbeg et Strand　アカムネグモ

34. *Oedothorax insecticeps* Boesenberg et Strand　セスデアカムネグネ

Oedothorax 屬のものは大阪市住吉區自宅樹林で採集せるのみ。

9. Fam. MIMETIDAE　センセウグモ科

35. *Ero foliata* L. Koch　センセウグモ

10. Fam. PHOLCIDAE　ユウレイグモ科

36. *Pholcus phalangioides* Fuessly　イヘユウレイグモ

37. *Pholcus crypticolens* Boesenberg et Strand　ユウレイグモ

北部，南部山地に見るも前種の如く多からず。

11. Fam. UROCTIDAE　ヒラタグモ科

38. *Uroctea compactilis* L. Koch　ヒラタグモ

12. Fam. ARGIOPIDAE　コガネグモ科

39. *Araneus nauticus* (L. Koch)　イヘオニグモ

40. *Araneus opima* (L. Koch)　コデチヤオニグモ

埴生臺地に多し。

41. *Araneus pentagrammicus* (Karsch)　アヲオニグモ

埴生臺地，南部山地。

42. *Araneus scylla* (Karsch)　ヤマシロオニグモ

43. *Araneus ventricosus* L. Koch　オニグモ

44. *Araneus cornutus* Clerck　ナカムラオニグモ

大阪平野に最も普通（現在の限界，濱寺町以北，以南不詳）南部山地

に産せず。

45. *Araneus akitaensis* Kishida　アキタオニグモ

大阪平野，北部山地（大和川以北）。

46. *Araneus vatius* Thorell　トスデオニグモ

北部山地（妙見山）。

47. *Araneus westringii* (Thorell)　ムツボシオニグモ

南部山地。

48. *Araneus scylloides* Boesenberg et Strand　サツマノミダマシ

49. *Araneus* sp.　カバキオニグモ（假稱）

南部山地。

50. *Argiope amoena* (L. Koch)　コガネグモ

51. *Argiope bruennichi* (Scopoli)　ナガコガネグモ

52. *Argiope minuta* Karsch　コガタコガネグモ

53. *Chrysaster typicus* Kishida　キララグモ

54. *Cyclosa argenteo-alba* Boesenberg et Strand　ギンメツキゴミグモ

55. *Cyclosa insulana* (Costa)　シマゴミグモ

56. *Cyclosa octotuberculata* Karsch　ゴミグモ

57. *Cyclosa sedeculata* Karsch　ユノハマゴミグモ

58. *Cyrtarachne bufo* (Boesenberg et Strand)　トリノフンダマシ

南部山地。

59. *Cyrtarachne fasciata* Kishida　シロオビトリノフンダマシ

60. *Dischiriognatha tenera* Karsch　ヒメアシナガグモ

61. *Dischiriognatha guadrimaculata* Boesenberg et Strand　ヨツボシヒメアシナガグモ

大阪平野に普通。

62. *Gasteracantha kuhlii* L. Koch　トゲグモ

63. *Grenognatha nipponica* Kishida　アヅマヒメアシナガグモ

大阪平野。

64. *Larinia argiopiformis* Boesenberg et Strand　コガネグモダマシ

65. *Leucauge blanda* (L. Koch)　シロガネグモ

66. *Meta doenitzi* Boesenberg et Strand　ドヨウグモ

67. *Meta kompirensis* Boesenberg et Strand　クニマノドヨウグモ

68. *Singa hamata* (Clerck)　ナガテオニグモ

大阪平野。

69. *Neotetragnatha typica* Kishida　シンアシナガグモ

70. *Nephila clavata* L. Koch　デヨラウグモ

71. *Tetragnatha praedonia* L. Koch　アシナガグモ

72. *Tetragnatha japonica* Boesenberg et Strand　ヤサガタアシナガグモ

73. *Tetragnatha squamata* Karsch　ウロコアシナガグモ

74. *Tetragnatha caudicula* (Karsch)　トガリアシナガグモ

75. *Theridiosoma epeiroides* Boesenberg et Strand　カラカラグモ

南部山地。

76. *Tylorida pulcher* Kishida　コガネマル

13. Fam. ARGYRONETIDAE　ミヅグモ科

77. *Cybaeus mellotteei* (Simon)　ナミハグモ

大阪府各地に産するも多からず。

14. Fam. PISAURIDAE　キシダグモ科

78. *Dolomedes angustivirgatus* Kishida　スデボソハシリグモ

79. *Dolomedes pallitarsis* Boesenberg et Strand　スデブトハシリグモ

80. *Dolomedes sulfureus* L. Koch　イワウイロハシリグモ

81. *Dolomedes saganus* Boesenberg et Strand　スデアカハシリグモ

南部山地（岩湧山）。

82. *Dolomedes fimbriatoides* Boeseuberg et Strand　スヂチヤハシリグモ
83. *Pisaura strandi* Kishida　ヤマヂキシダグモ
84. *Caripeta japonica* Boesenberg et Strand　カリウドグモ

北部山地（妙見山）。

15. Fam. LYCOSIDAE　ドクグモ科

85. *Lycosa coelestis* L. Koch　ハラクロドクグモ
86. *Lycosa pseudoannulata* Boesenberg et Strand　キクヅキドクグモ
87. *Lycosa T-insignita* Boesenberg et Strand　ウヅキドクグモ
88. *Lycosa virgata* Kighida　スヂドクグモ
89. *Lycosa ruber* Kishida　アカドクグモ

大阪平野のみ，山地には見ず。

90. *Lycosa procurva* Boesenberg et Strand　チビドクグモ
91. *Lycosa cinereofusca* Doenitz et Strand　セアヲドクグモ
92. *Lycosa laura* (Karsch)　ハリゲドクグモ

16. Fam. OXYOPIDAE　ササグモ科

93. *Oxyopes sertatus* L. Koch　ササグモ

17. Fam. AGELENIDAE　タナグモ科

94. *Agelena limbata* Thorell　クサグモ
95. *Agelena opulenta* L. Koch　コクサグモ
96. *Coras insidiosus* (L. Koch)　シモフリイホグモ
97. *Tegenaria domestica* (Clerck)　タナグモ
98. *Tegenaria corasides* Boesenberg et Strand　シモフリタナグモ
99. *Tegenaria dorsata* Kishida　ケムリタナグモ

北部山地（妙見）。

18. Fam. HAHNIIDAE　ハタケグモ科

100. *Hahnia* sp.　ハタケグモ

大阪平野北部にて一頭得しのみ。

F. Suprafam CLUBIONOIDAE フクログモ上科

19. Fam. THOMISIDAE カニグモ科

101. *Coriarachne fulvipes* (Karsch) コカニグモ

102. *Eremita typica* Kishida タンゴグモ

103. *Misumena tricuspidata* (Fabricius) ハナグモ

104. *Oxytate striatipes* L. Koch ワカバグモ

105. *Philodromus bambusanus* Kishida ヤブヱビグモ

106. *Philodromus roseus* Kishida エビグモ

107. *Philodromus spinitarsis* Simon キハダエビグモ

108. *Synaema globosa japonica* Karsch フノジグモ

109. *Thomisus albus* (Gmelin) シロアヅチグモ

大阪平野。

110 *Thomisus labefactus* Karsch マユタテアヅチグモ

111. *Thomisus bimaculatus* Boeseuberg et Strand キリシマアヅチグモ

112. *Tibellus oblongas* Latreille シヤコグモ

東部山地（生駒山脈）。

113. *Xysticus ephippiatus* Simon ヤミイロカニグモ

20. Fam. SALTICIDAE ハヘトリグモ科

114. *Aelurillus dimorphus* Doenitz et Strand クロスヂハヘトリ

115 *Evarcha albaria* (L. Koch) マミジロハヘトリ

116 *Evophrys nipponicus* Kishida ネコハヘトリ

117. *Hasarius adansoni* (Audouin) アダンソンハヘトリ

118. *Hyllus lamperti* Boesenberg et Strand ランペルトハヘトリ

119. *Icius elongatus* Karsch ヤハズハヘトリ

120. *Icius magister* Karsch クロハネグモ

121. *Jotus munitus* Boesenberg et Strand アサヒハヘトリ
122. *Jotus pictus* Kishida エゾラハヘトリ
123. *Marpissa vittata* Karsch アヲオビハヘトリ
124. *Menemerus confusus* Boesenberg et Strond ハヘトリグモ
125. *Menemerus pulla* (Karsch) ヨダンハヘトリ
126. *Myrmarachne japonica* (Karsch) アカアリグモ
127. *Myrmarachne innermichelis* Boesenberg et Strand クロアリグモ
128. *Myrmarachne kuma* Kishida クマアリグモ
129. *Plexippus crassipes* Karsch アシブトハヘトリ
130. *Plexippus paykulli* (Audouin) チヤスヂハヘトリ
131. *Plexippus setipes* Karsch ミスヂハヘトリ
132. *Rhene atrata* (Karsch) カラスハヘトリ
133. *Siler cupreus* Simon アカガネハヘトリ
134. *Sitticus mori* Kishida クハハヘトリ
135. *Telamonia bifurcilinea* Boesenberg et Strand キアシハヘトリ
136. *Menemerus brachygnatus* Thorell
137. *Hasarius crusifer* Doenitz et Strand ジウノジハヘトリ

21. Fam. CLUBIONIDAE フクログモ科

138. *Castaneira niger* Kishida デガバチグモ
139. *Chiracanthiun lascivum* Karsch コマチグモ
140. *Chiracanthium rubicundulum* Kishida エドコマチグモ
141. *Chiracanthium japonicum* Boesenberg et Strand カバキコマチグモ
南部山地。
142. *Chiracanthium eutittha* Boesenberg et Strand アシナガコマチグモ
南部山地。
143. *Clubiona japonica* L. Koch フクログモ

144. *Clubiona japonicola* Boesenberg et Strand　ハマキフクログモ

145. *Clubiona jucanda* (Karsch)　ヤハズフクログモ

146. *Itatsina dorsilineata* (Doenitz et Strand)　イタチグモ

北部，東部，南部山地。

147. *Clubiona bitescens* Westring　トビイロフクログモ

南部山地。

22. Fam. HETEROPODIDAE アシダカグモ科

148. *Heteropoda venatoria* (Linneaus)　アシダカグモ

149. *Heteropoda forcipata* (Karsch)　コアシダカグモ

平地に見ず，山地に見る。

23. Fam. SELENOPIDAE アハセグモ科

150. *Selenopus bursarius* Karsch　アハセグモ

大阪平野（少），東部山地（多）。

24. Fam CTENIDAE シボグモ科

151. *Anahita fauna* Karsch　シボグモ

大阪平野。

25. Fam. PLATORIDAE ヒトヘグモ科

152. *Hitoegumoa nipponica* Kishida　ヒトヘグモ

大阪平野，殖生臺地。

26. Fam. DRASSIDAE ワシグモ科

153. *Gnaphosa compirensis* Boesenberg et Strand　メキリグモ

154. *Yoshidaia typica* Kishida　ヨシダグモ

155. *Zelotes pallidipatellis* (Boesenberg et Strand)　マエトビケブリグモ

156. *Scotophaeas striatus* Kishida　トラフグモ

以上の屬・種を科別に分類すると次表の如くになる。今少し頑張れば遠からずして200種を突破する日が來るであらうと思ふ。

Fam.	Gen.	Sp.
Ctenizidae (トタテグモ科)	1	1
Atypidae (デグモ科)	2	2
Dysderidae (キノシングモ科)	1	1
Dictynidae (ハグモ科)	2	3
Uloboridae (ウヅグモ科)	3	5
Scytodidae (ヤマシログモ科)	2	3
Theridiidae (ヒメグモ科)	6	13
Linyphiidae (サラグモ科)	2	6
Mimetidae (センセウグモ科)	1	1
Pholcidae (ユウレイグモ科)	1	2
Uroctidae (ヒラタグモ科)	1	1
Argiopidae (コガネグモ科)	17	38
Argyronetidae (ミヅグモ科)	1	1
Pisauridae (キシダグモ科)	3	7
Lycosidae (ドクグモ科)	1	8
Oxyopidae (ササグモ科)	1	1
Agelenidae (タナグモ科)	3	6
Hahniidae (ハタケグモ科)	1	1
Thomisidae (カニグモ科)	9	13
Salticidae (ハヘトリグモ科)	15	24
Clubionidae (フクログモ科)	4	10
Heteropodidae (アシダカグモ科)	1	2
Selenopidae (アハセグモ科)	1	1
Ctenidae (シボグモ科)	1	1
Platoridae (ヒトヘグモ科)	1	1
Drassidae (ワシグモ科)	4	4
26科	88屬	156種